Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik A

Vorlesung von Prof. Dr. N. Bäuerle

Mitschrift: Moritz Diehle¹

Bilder und Layout: Daniel Zaum²

Version 0.9.1

Vielen Dank an alle, die Fehler gemeldet haben.

Alle gefundenen Fehler bitte melden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

7. Februar 2003

¹Moritz.Diehle@stud.uni-hannover.de

²cowhen@cowhen.com

Inhaltsverzeichnis

1	Wahrscheinlichkeitstheorie	2
	Wahrscheinlichkeitstheorie	2
§1	Wahrscheinlichkeitsräume und Kombinatorik	2
	Satz 1.2: Siebformel	4
§2	Unabhängigkeit von Ereignissen und bedingte Wahrscheinlichkeit	8
	Lemma 2.1: Multiplikationssatz	9
	Satz 2.2: Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit	9
	Satz 2.3: Bayes'sche Formel	10
§3	Zufallsvariablen und deren Verteilung	11
	Satz 3.5: Dichtetransformation	22
§4	Charakteristiken von Zufallsvariablen und Zufallsvektoren	24
	4.1 Erwartungswert und Momente von Zufallsvariablen	24
	4.2 Charakteristiken mehrdimensionaler Verteilungen	27
§5	Abschätzung für Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeiten	31
	Satz 5.1: Ungleichung von Cauchy-Schwarz	31
	Satz 5.2: Ungleichung von Chebyshev	31
§6	Erzeugende Funktionen	33
	Satz 6.2: Eindeutigkeitssatz für erzeugende Funktionen	33
	Satz 6.4: Stetigkeitssatz für erzeugende Funktionen	34
	Satz 6.7: Eindeutigkeitssatz	36
	Satz 6.8: Stetigkeitssatz	36
§7	Grenzwertsätze	37
	7.1 Der zentrale Grenzwertsatz	37
	Satz 7.1: Zentraler Grenzwertsatz	37
	Satz 7.3: Berry Esséen	39
	7.2 Gesetze der großen Zahlen	39
	Satz 7.4: Schwaches Gesetz der großen Zahlen	39
	Satz 7.5: Starkes Gesetz der großen Zahlen	40
§8	Erzeugung von Zufallszahlen	42
§9	Randomisierte Algorithmen	44
	Index	45

Kapitel 1

Wahrscheinlichkeitstheorie

¹ = mathematische Analyse zufälliger Erscheinungen, die

1. Keine deterministische Regularität besitzen
2. eine statistische Regularität besitzen

Beispiel: Wahrscheinlichkeit, daß ich im Lotto 6 Richtige habe ist sehr klein.

Wahrscheinlichkeit, daß irgendjemand 6 Richtige hat ist groß.

Beispiel: Wie viele Leute müssen in einer Gruppe sein, damit die Wahrscheinlichkeit $\geq \frac{1}{2}$ ist, daß 2 am gleichen Tag Geburtstag haben? $n = 23$.

§1 Wahrscheinlichkeitsräume und Kombinatorik

Gegeben sei ein Experiment (z.B. Würfeln):

Ω = Raum der Versuchsausgänge (z.B. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)

$\omega \in \Omega$ Elementarereignis

$A \subset \Omega$ = Ereignis (z.B. $A = \{2, 4, 6\}$ „gerade Zahl fällt“)

Beispiel: Zuerst wird eine Münze geworfen. Fällt Kopf wird mit einem Würfel geworfen, fällt Zahl, so wird nochmal mit der Münze geworfen.

$$\Omega = \{K1, K2, K3, K4, K5, K6, ZK, ZZ\}$$

Ereignissen $A \subset \Omega$ werden jetzt Wahrscheinlichkeiten zugeordnet. Ist Ω nicht abzählbar, z.B. $\Omega = [0, 1]$, so können nicht alle Mengen $A \subset [0, 1]$ Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden, um ein sinnvolles mathematisches Modell zu bekommen.

Definition:

a) Eine Familie $\mathcal{A}$ von Teilmengen von Ω heißt *Algebra*, falls gilt:

(i) $\Omega \in \mathcal{A}$

(ii) $A \in \mathcal{A} \implies A^c = \Omega - A \in \mathcal{A}$

(iii) $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$

¹17.10.2002

b) Eine Algebra heißt σ -Algebra, falls zusätzlich gilt:

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

Beispiele: „Würfel“

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$$

$$\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}, \Omega\}$$

$$\mathcal{A}_3 = \mathcal{P}(\Omega) = \text{Menge aller möglichen Teilmengen.}$$

Sind σ -Algebren.

Bemerkung:

- (i) Das Paar $(\Omega, \mathcal{A})$ mit $\mathcal{A}$ σ -Algebra heißt *Messraum*.
- (ii) Jede σ -Algebra ist abgeschlossen gegen abzählbare Durchschnitte.
- (iii) Sind $A, B \subset \Omega$ und $A \cap B = AB = \emptyset$ (A und B sind disjunkt), so schreiben wir $A + B$ statt $A \cup B$.
- (iv) $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ ist stets eine σ -Algebra.

Definition:

Sei $(\Omega, \mathcal{A})$ ein Messraum. Eine Funktion $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ heißt *Wahrscheinlichkeitsmaß*, falls

- (i) $P(\Omega) = 1$
 - (ii) $P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$, falls $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, 2, 3, \dots$
- Das Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ heißt *Wahrscheinlichkeitsraum*.

Lemma 1.1:

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$.

Dann gilt:

- a) $P(\emptyset) = 0$
- b) $P(A^c) = 1 - P(A)$
- c) $A_1 \subset A_2 \implies P(A_1) \leq P(A_2)$
- d) $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$
- e) $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$

Beweis:

a) Setze $A_1 = A_2 = \dots = \emptyset$ in (ii):

$$P(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} nP(\emptyset) \implies P(\emptyset) = 0.$$

$$d) A_1 \cup A_2 = [A_1 - (A_1 \cap A_2)] + A_2 + \emptyset + \dots$$

$$\left. \begin{aligned} \implies P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1 - (A_1 \cap A_2)) + P(A_2) + 0 + \dots \\ P(A_1) &= P(A_1 - (A_1 \cap A_2)) + P(A_1 \cap A_2) \end{aligned} \right\} \implies \text{Beh.}$$

Der klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff bezieht sich auf sogenannte Laplacesche Wahrscheinlichkeitsräume.

Definition:

Ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ heißt *Laplacescher Wahrscheinlichkeitsraum*, falls gilt:

- (i) Ω ist endlich, d.h. $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$
- (ii) $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$
- (iii) $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{n}$ für $\omega \in \Omega$, d.h. alle Versuchsausgänge sind gleich wahrscheinlich

Bemerkung:

- (i) Für $A \subset \Omega$ gilt $P(A) = P(\sum_{\omega \in A} \{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \frac{|A|}{|\Omega|}$
- (ii) P ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß, denn

$$P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$$

$$P\left(\sum_{i=1}^k A_i\right) = \frac{|A_1 + \dots + A_k|}{|\Omega|} = \frac{|A_1|}{|\Omega|} + \dots + \frac{|A_k|}{|\Omega|} = P(A_1) + \dots + P(A_k)$$

Hauptproblem hier: Bestimmung der Elementzahl von Teilmengen.

Eine nützliche Verallgemeinerung von Lemma 1.1 d) ist die sogenannte Siebformel von Sylvester - Poincaré:

Satz 1.2: (Siebformel)

Ist $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum, so gilt für beliebige $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

Für $n = 2$ ergibt sich Lemma 1.1 d).

2 Permutationen

I. Gegeben: n verschiedene Dinge = Elemente

Eine *Permutation* der Elemente ist eine beliebige Aufreihung der Elemente.

Beispiel: Gegeben: a,b,c

Mögliche Permutationen: abc, acb, bac, bca, cab, cba

Lemma 1.3:

Die Anzahl der Permutationen von n verschiedenen Elementen ist $n! = n(n - 1) \dots 1$.

Beweis: Für den ersten Platz hat man n Möglichkeiten.

Für den zweiten Platz hat man $(n - 1)$ Möglichkeiten. etc. □

Beispiel: 10 Personen sitzen an einem langen Tisch.

Wie viele verschiedene Sitzordnungen gibt es? Antwort: 10!

- II. Gegeben: n Elemente, die nicht alle verschieden sind.
 Es seien n_1 Elemente vom Typ 1, n_2 vom Typ 2, $\dots$, n_k vom Typ k .

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$$

Lemma 1.4: Die Anzahl der Permutationen von n Elementen mit jeweils $n_1, n_2, \dots, n_k$ gleichen Elementen ist

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

Beweis: Zunächst nummerieren wir die gleichen Elemente durch, um sie zu unterscheiden. Dann gibt es nach Lemma 1.3 $n!$ mögliche Permutationen. Zu einer Klasse K_i fassen wir die Permutationen zusammen bei denen die Elemente vom Typ i die Plätze tauschen. $\Rightarrow |K_i| = n_i!$
 $\Rightarrow$ Behauptung

Beispiele: Eine Urne enthält 10 Kugeln. 5 rote Kugeln, 2 schwarze und drei Blaue. Die Kugeln werden nacheinander gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das zuerst die roten, dann die schwarzen und zuletzt die Blauen Kugeln gezogen werden?

Antwort: $\left(\frac{10!}{5!2!3!}\right)^{-1} = 0,0004$

Kombination = Einfache Urnenmodelle

Kombinationen: Urne mit n Elementen, numeriert $1, 2, \dots, n$.

$k \leq n$ Elemente werden „zufällig“ gezogen.

I Ziehen mit Zurücklegen, mit Berücksichtigung der Reihenfolge

Lemma 1.5: Die Anzahl der Kombinationen k -ter Ordnung von n verschiedenen Elementen, die beliebig oft wiederholt werden können mit Berücksichtigung der Reihenfolge ist:

$$n^k$$

Beispiel: Mit den Ziffern $1, 2, \dots, 9$ kann man $9^3 = 729$ verschiedene 3-stellige Zahlen bilden. ($n = 9, k = 3$)

II Ziehen ohne Zurücklegen, mit Berücksichtigung der Reihenfolge

Lemma 1.6: Die Anzahl der Kombinationen k -ter Ordnung von n verschiedenen Elementen mit Berücksichtigung der Reihenfolge ist:

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Beweis: Beim ersten Zug gibt es n Möglichkeiten.
 Beim Zweiten Zug $(n-1)$ Möglichkeiten.

$\vdots$

Beim k -ten Zug gibt es $(n-l+1)$ Möglichkeiten.

Beispiel: Anzahl der 3-stelligen Zahlen mit verschiedenen Ziffern $1, \dots, 9$ ist $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$

III Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Lemma 1.7: Die Anzahl der Kombinationen k -ter Ordnung von n verschiedenen Elementen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge ist:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Beweis: Bei Berücksichtigung der Reihenfolge ergeben sich $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten. Die k Elemente kann man auf k! verschiedene Weisen anordnen.

⇒ ohne Berücksichtigung der Reihenfolge $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ □

Beispiel: Lotto: 6 aus 49. Es gibt 13.983.816 verschiedene Möglichkeiten für die 6 Zahlen.

IV Ziehen mit Zurücklegen, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Lemma 1.8: Die Anzahl der Kombination k-ter Ordnung von n verschiedenen Elementen, die beliebig oft wiederholt werden können, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge ist:

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Beweis: Bei III bestimmen wir eigentlich die Anzahl aller verschiedenen k-Tupel natürlicher Zahlen $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ mit

$$1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n \quad (III)$$

Bei IV suchen wir die Anzahl aller verschiedener k-Tupel natürlicher Zahlen $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ mit

$$1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k \leq n \quad (IV)$$

Durch die Abbildung $m_j = n_j + j - 1, \quad j = 1, \dots, k$ bilden wir (IV) auf (III) ab mit $\hat{n} = n + k - 1$:

Es gilt $1 \leq m_1 < m_2 < \dots < m_k \leq (n + k - 1)$

n1	n2	n3	n4
1	1	3	7
⋮	⋮	⋮	⋮
1	2	5	10
m1	m2	m3	m4

Diese Abbildung ist bijektiv, da durch $n_j = m_j - j + 1$ die Umkehrabbildung gegeben ist.

Die Anzahl der Elemente in den Mengen ist also gleich. $\stackrel{L.1.7}{\Rightarrow}$ Anzahl = $\binom{n+k-1}{k}$ □

Beispiel:

Von 0 aus kann man auf dem Zahlenstrahl entweder eine Position nach rechts oder eine nach links gehen. Wieviele Zahlen sind nach k Zügen erreichbar?

Antwort: $n = 2, k$
 $\binom{k+1}{k}$

Anzahl der Stichproben		
Umfang k aus $[1, \dots, n]$	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

³ Weitere Beispiele:

1. Auf wieviele Arten lassen sich k nicht unterscheidbare Marken auf n Schubladen verteilen? Nummeriere die Schubladen $1, \dots, n$ und reihe die Marken auf. Ordne jeder Marke eine Schubladennummer zu.
 Also: Ziehen mit Zurücklegen ohne Reihenfolge. $\binom{n+k-1}{k}$
2. Das Schaufenster eines Elektrogeschäfts soll mit Glühbirnen, die sich nur in ihrer Farbe unterscheiden, dekoriert werden. Es stehen 4 rote, 5 grüne, 3 blaue und 6 gelbe Glühbirnen zur Verfügung.
 Wie viele Anordnungsmöglichkeiten bestehen wenn die Glühbirnen

a) in Reihe angeordnet werden und Gleichfarbige beisammen stehen sollen.

b) in beliebiger Reihenfolge in einer Reihe angeordnet werden?

Antwort: a) $4!$ b) $\frac{18!}{4! \cdot 5! \cdot 3! \cdot 6!} \approx 5,1459 \cdot 10^8$

3. Es sei $S_n =$ Menge aller Permutationen der Zahlen $\{1, 2, \dots, n\}$

Eine Permutation heisst absolut, falls sie keine einzige Zahl fest läßt.

(z.B. 2413 absolute Permutation, 2134 *Keine* absolute Permutation)

Abs = Menge aller absoluter Permutationen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine absolute Permutation auftritt?

$(Abs)^c = \bigcup_{i=1}^n A_k$ $A_k =$ Menge aller Permutationen, die die Zahl k festlassen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(Abs) &= 1 - P((Abs)^c) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n A_k\right) \\ &= 1 - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \underbrace{\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k})}_{=: S_k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \cdot S_k \end{aligned}$$

$A_{i_1} \cdot \dots \cdot A_{i_k} =$ Menge der Permutationen, die die Zahlen $i_1, \dots, i_k$ festlassen.

$$|A_{i_1} \cdot \dots \cdot A_{i_k}| = (n - k)!$$

$$P(A_{i_1} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = \frac{(n - k)!}{n!}$$

Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ zu erfüllen. (Typ III)

$$\Rightarrow S_k = \binom{n}{k} \cdot \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{1}{k!}$$

$$P(Abs) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

§2 Unabhängigkeit von Ereignissen und bedingte Wahrscheinlichkeit

Im folgenden sei ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ gegeben. Alle auftretenden Ereignisse seien $\in \mathcal{A}$.

Definition:

a) Zwei Ereignisse A und B heißen *unabhängige Ereignisse* falls gilt:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

b) n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ heißen unabhängig, falls für alle $k = 1, \dots, n$ und für alle k-Tupel $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ stets gilt:

$$P(A_{i_1} \cdot \dots \cdot A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

c) unendlich viele Ereignisse heißen unabhängig, falls je endlich viele von ihnen unabhängig sind.

Bemerkung:

(i) In der Regel stimmt der intuitive Begriff der Unabhängigkeit mit dem mathematischen Begriff überein. So sind z.B. beim Ziehen *mit* Zurücklegen die Ereignisse $A_i = \{\text{Zahl beim } i\text{-ten Zug}\}$ $i = 1, \dots, n$ im Laplace-Experiment unabhängig. Ohne zurücklegen liefert abhängige Ereignisse. Nicht so intuitiv ist das nächste Beispiel.

(ii) Teilsysteme von unabhängigen Ereignissen sind unabhängig.

Beispiel: Werfen eines „fairen“ Tetraeders. Eine Seite ist rot, eine grün, eine Blau und eine Seite besitzt alle 3 Farben. Es seien folgende Ereignisse definiert: (1 Wurf)

A = „Rot kommt“

B = „Grün kommt“

C = „Blau kommt“

Dann gilt offensichtlich:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ Die Ereignisse A und B sind unabhängig.

Die Ereignisse A und C sind unabhängig.

Die Ereignisse B und C sind unabhängig.

Jedoch: die Ereignisse A, B und C sind *nicht* unabhängig.

Frage: wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses A, wenn zusätzlich bekannt wird, daß das Ereignis B eingetreten ist?

Beispiel: 1 mal Würfeln

A = Es wird eine 1 gewürfelt, B = es wird eine ungerade Zahl gewürfelt.

Definition: Es sei B ein Ereignis mit $P(B) > 0$. Für jedes Ereignis A heißt die Größe $P^*(A) = P(A|B) := \frac{P(AB)}{P(B)}$ die *bedingte Wahrscheinlichkeit von A* (unter der Bedingung B).

Bemerkung: $(B, \mathcal{A}^*, P^*)$, wobei $\mathcal{A}^* = \{A \in \mathcal{A} | A \subseteq B\}$ ist wieder ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Beispiel: 1 mal Würfeln (siehe vorher)

$$P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = P(\text{Es wird eine 1 gewürfelt}) = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Oft ist die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ gegeben und man muss $P(AB)$ bestimmen. Also $P(AB) = P(A|B) \cdot P(B)$.

Eine Verallgemeinerung hiervon ist

Lemma 2.1: Multiplikationssatz

Es seien $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ Ereignisse mit $P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) > 0$.

Dann gilt:

$$P(A_1 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

$$= \prod_{k=1}^n P(A_k|A_1 \dots A_{k-1})$$

Beweis erfolgt durch vollständige Induktion nach n.

⁴ **Beispiel:** Von einem Kartenspiel mit 32 Karten bekommt jeder von 3 Spielern 10 Karten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß jeder der 3 Spieler genau ein As erhält?

A_i = Spieler i erhält genau ein As, $i = 1, 2, 3$.

Gesucht: $P(A_1A_2A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1A_2)$

$$P(A_1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{28}{9}}{\binom{32}{10}}, P(A_2|A_1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{19}{9}}{\binom{22}{10}}, P(A_3|A_1A_2) = \frac{\binom{2}{1}\binom{10}{9}}{\binom{12}{10}}$$

Satz 2.2: (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit)

Es seien $B_1, B_2, \dots$ endlich viele oder abzählbar unendlich viele paarweise disjunkte Ereignisse mit

(i) $P(B_i) > 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots$

(ii) $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$

d.h. diese (B_i) bilden eine Zerlegung von Ω .

Dann gilt für jedes $A \in \mathcal{A}$:

$$P(A) = \sum_i P(B_i) \cdot P(A|B_i)$$

$$\text{Beweis: } P(A) = P(A \cap \Omega) = P\left(A \cap \left(\bigcup_i B_i\right)\right) = P\left(\bigcup_i (A \cap B_i)\right) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(B_i) \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} = \sum_i P(B_i) P(A|B_i) \quad \square$$

Beispiel: Hannover 96 vs. Kaiserslautern

Falls Fredi Bobic eine Trefferquote $\geq 30\%$, dann hat Hannover eine Siegchance von 75%. Ist die Trefferquote $< 30\%$, so hat Hannover eine Siegchance von 40%. Bei Spielen gegen KL ist die Wahrscheinlichkeit, daß F.B. eine Trefferquote von $\geq 30\%$ hat, 70%. Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, daß H96 gegen KL gewinnt?

Es sei $T =$ F.B. hat Trefferquote von $\geq 30\%$

$T^c =$ F.B. hat Trefferquote von $< 30\%$

$S =$ Sieg für H96

$$\begin{aligned} P(S) &= P(T)P(S|T) + P(T^c)P(S|T^c) \\ &= 0,7 \cdot 0,75 + 0,3 \cdot 0,4 \\ &= 0,645 \end{aligned}$$

Satz 2.3: (Bayes'sche Formel)

Es seien $B_1, B_2, \dots$ eine endliche oder abzählbar unendliche Zerlegung von Ω wie in Satz 2.2 [Seite 9]. Dann gilt für jedes $A \in \mathcal{A}$ mit $P(A) > 0$:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) \cdot P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j) \cdot P(A|B_j)}$$

$$\text{Beweis: } P(B_i|A) = \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \cdot P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j) \cdot P(A|B_j)} \quad \square$$

Beispiel: Bei der binären Übertragung von Nachrichten werden durch Störungen 5% der gesendeten Nullen zu Einsen und umgekehrt 3% der gesendeten Einsen zu Nullen verfälscht. Das Verhältnis der gesendeten Nullen zu den gesendeten Einsen betrage 3:5.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine empfangene Null richtig ist?

Mathematisches Modell: $\Omega = \{(i, j) \mid i, j \in \{0, 1\}\}$

1.Komponente: gesendetes Signal

2.Komponente: empfangenes Signal

Ereignisse: S_0 : Eine Null wird gesendet = $\{(0, 1), (0, 0)\}$

S_1 : Eine Eins wird gesendet = $\{(1, 0), (1, 1)\}$

E_0 : Eine Null wird empfangen = $\{(0, 0), (1, 0)\}$

Bekannt sind: $P(E_0|S_0) = 0,95$ $P(E_0|S_1) = 0,03$ $\frac{P(S_0)}{P(S_1)} = 0,6$

$\Omega = S_0 + S_1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(S_0|E_0) &= \frac{P(S_0)P(E_0|S_0)}{P(S_0)P(E_0|S_0) + P(S_1)P(E_0|S_1)} = \frac{1}{1 + \frac{P(S_1)P(E_0|S_1)}{P(S_0)P(E_0|S_0)}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{10}{6} \cdot \frac{0,03}{0,95}} = 0,95 \end{aligned}$$

§3 Zufallsvariablen und deren Verteilung

Bisher haben wir uns für Teilmengen $A \in \Omega$ interessiert bzw. spezielle $\omega \in \Omega$. Oft interessiert aber nicht Ω selbst sondern gewisse Kennzahlen von ω .

Beispiel:

1. $\Omega =$ Menge aller Eintragungen in einem Telefonbuch
 $\omega =$ Familienname, $X(\omega) =$ Anzahl der Buchstaben von ω .
 $\omega =$ Telefonnummer, $X(\omega) =$ Anzahl der Ziffer „1“ in ω .

2. 2 mal Würfeln

$$\Omega = \{\omega = (w_1, w_2) \mid w_i \in \{1, \dots, 6\} \ i = 1, 2\}$$

$$\text{Augensumme } \omega \mapsto X(\omega) = w_1 + w_2$$

$$\{\omega \mid X(\omega) = 10\} = \{(6, 4), (5, 5), (4, 6)\}$$

Definition: Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum. Die Abbildung $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Zufallsvariable*, falls für jedes $x \in \mathbb{R}$:

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}$$

Wir unterscheiden:

1. **diskrete Zufallsvariable:** X nimmt hier nur abzählbar viele verschiedene Werte an

Beispiel: Augensumme bei 2 mal Würfeln

2. **stetige Zufallsvariable:** X hat einen überabzählbaren Wertebereich z.B. $[a, b]$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$ etc.

Beispiel: Lebensdauer eines Radios.

Ist $\Omega = \mathbb{R}$, so können wir *nicht* $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ wählen. Hier wählt man die Borelsche σ -Algebra.

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a_i, b_i], -\infty \leq a_i < b_i \leq \infty\})$$

Verteilungsfunktion und Dichte

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

Definition: Die Funktion $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ sei $F_X(x) := P(X \leq x) = P(\{\omega \mid X(\omega) \leq x\})$ heißt *Verteilungsfunktion*.

Eigenschaften von Verteilungsfunktionen F_X :

1. $F_X(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$.

2. $F_X(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.

3. $F_X(x) \leq F_X(x + h) \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ und } h \geq 0$, d.h. F_X ist immer nicht fallend.

4. $F_X(x)$ ist rechtsseitig stetig, d.h. für jede Folge $\{h_n\}$ mit $h_n \geq 0$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ gilt:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x + h_n) = F_X(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

⁵ **Bemerkungen:**

(i) Mit Hilfe der Verteilungsfunktion F_X lassen sich folgende Wahrscheinlichkeiten ausdrücken:

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(\{X \leq b\} - \{X < a\}) = P(\{X \leq b\} - \{X \leq a\} + \{X = a\}) \\ &= P(X \leq b) - P(X \leq a) + P(X = a) \\ &= F_X(b) - F_X(a) + P(X = a) \end{aligned}$$

(ii) Sei jetzt X diskret und nehme die Werte $x_1, x_2, \dots$ an.
Weiter sei $p(x_i) := P(X = x_i)$. Dann gilt:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P\left(\sum_{x_i \leq x} \{X = x_i\}\right) = \sum_{x_i \leq x} \underbrace{P(X = x_i)}_{=p(x_i)}$$

Die Abbildung $x_i \mapsto p(x_i)$ heißt **Zähldichte**.

Beispiel: $X =$ Augensumme bei 2 mal Würfeln.
 X ist diskret mit Werten $2, 3, \dots, 12$.

Zähldichte	x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	$p(x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Verteilungsfunktion

Wichtige diskrete Verteilungsfunktionen / Zähldichten sind:

1. **Binomialverteilung** $B_{n,p}$

Beispiel: Münze wird n -mal geworfen.

$$\Omega = \{(w_1, \dots, w_n) \mid w_i \in \{K, Z\} \ i = 1, \dots, n\}$$

$$X : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, n\} \text{ mit } X(\Omega) = \text{Anzahl der Kopf-Würfe} = \sum_{i=1}^n 1_{w_i=K}$$

Weiter seien die Ereignisse $A_i = \{w \mid w_i = K\}$, $i = 1, \dots, n$ unabhängig und $P(A_i) = p$, $i = 1, \dots, n$.

$$P(X = k) = ?$$

$$P(X = k) = P\left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A_{i_1} \dots A_{i_k} \cdot \prod_{j \neq i_k} A_j^c\right)$$

$$P\left(A_{i_1} \dots A_{i_k} \cdot \prod_{j \neq i_k} A_j^c\right) = p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$\Rightarrow P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

X nimmt hier die Werte $0, 1, \dots, n$ an.

Zähldichte: $p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ Parameter $n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1)$

2. Hypergeometrische Verteilung $H_{n,m,r}$

Beispiel: Urne mit r roten und s schwarzen Kugeln. $r + s = n$ ($\Rightarrow s = n - r$)

Es werden m Kugeln (ohne Zurücklegen) gezogen.

ω = Ergebnis der Ziehung

$X(\omega) = \#$ der gezogenen roten Kugeln.

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{n-r}{m-k}}{\binom{n}{m}}$$

X nimmt die Werte $k = \max\{0, m - \underbrace{(n-r)}_{=s}\}, \dots, \min\{r, m\}$ an.

Zähldichte: $p(k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{n-r}{m-k}}{\binom{n}{m}}$ $r, n, m \in \mathbb{N}$ Parameter

3. Poisson-Verteilung Π_λ

X nimmt die Werte $0, 1, 2, \dots$ an.

Zähldichte: $p(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, \dots$

$$\text{Probe: } \sum_{k=0}^{\infty} p(k) = e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}}_{=e^\lambda} = 1$$

Bemerkung: Falls n groß, ist die Berechnung der Verteilungsfunktion der Binomialverteilung schwierig, da viele Summanden aufzusummieren sind.

Dann: Approximation durch Poisson-Verteilung.

Es gilt:

$$\text{Sei } F_\lambda(x) = \text{Verteilungsfunktion von } \Pi_\lambda$$

$$F_{n, \frac{\lambda}{n}}(x) = \text{Verteilungsfunktion von } B_{n, \frac{\lambda}{n}}$$

Dann gilt: $F_{n, \frac{\lambda}{n}}(x) \rightarrow F_\lambda(x)$ für $n \rightarrow \infty, \forall x \in \mathbb{N}_0$

Lemma 3.1: Sei $F_\lambda(x)$ die Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung mit Parameter λ und $F_{n,p}(x)$ sei die Verteilungsfunktion der Binomialverteilung mit Parametern n und p , dann gilt:

$$F_{n, \frac{\lambda}{n}}(x) \rightarrow F_\lambda(x) \text{ für } n \rightarrow \infty$$

Beweis: Da $F_\lambda(x)$ und $F_{n,p}(x)$ nur bei $x \in \mathbb{N}_0$ springen, genügt es, die Aussage für die Zähldichten zu zeigen, d.h. zu zeigen ist

$$\begin{aligned}
 p_k &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\
 p_k &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\
 &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n!}{(n-k)! n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \\
 &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\overbrace{n(n-1)\cdots(n-k+1)}^{\text{k-Faktoren} \rightarrow 1}}{n \cdot n \cdots n} \frac{\overbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}^{\rightarrow e^{-\lambda}}}{\underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}_{\rightarrow 1}} \\
 &\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \text{ für } n \rightarrow \infty
 \end{aligned}$$

4. Geometrische Verteilung

Beispiel: Wir würfeln bis erstmals eine 6 fällt:

$X(\omega)$ = Anzahl der Würfe

$$P(X = k) = P(\text{Wurf 1 bis } (k-1) \text{ keine 6, dann 6}) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{6} = p^{k-1}(1-p)$$

mit $p = \frac{5}{6}$

X nimmt wieder Werte 0, 1, 2, ... an.

Zähldichte: $p(k) = (1-p)p^k$, $k = 0, 1, \dots$ mit $0 < p < 1$

5. Negative Binomialverteilung

Beispiel: Münzwurf $(k+m)$ -mal. Wahrscheinlichkeit für „Zahl“ = p . Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit im $(k+m)$ -ten Wurf zum m -ten mal „Zahl“ zu werfen = $p(k)$.

$$p(k) = \binom{k+m-1}{m-1} (1-p)^k p^m = \binom{k+m-1}{k} (1-p)^k p^m$$

X nimmt die Werte 0, 1, 2, ... an.

Zähldichte: $p(k) = \binom{k+m-1}{m-1} p^m (1-p)^k$, $k = 0, 1, \dots$ mit $0 < p < 1, m \in \mathbb{N}$ Parameter

⁶ Im folgenden betrachten wir stetige Zufallsvariablen:

Definition: Eine Zufallsvariable X heißt *absolut stetige Zufallsvariable*, falls es eine integrierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ gibt, so daß die Verteilungsfunktion F_X von X die folgende Darstellung hat:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$$

f nennt man *Dichte* von X.

Bemerkung:

⁶21.11.2002

(i) Es muss gelten: $\int_{-\infty}^{\infty} f(y)dy = 1, f(y) \geq 0, \forall y \in \mathbb{R}.$

(ii) X absolut stetig $\Rightarrow F_X(x)$ stetig.

(iii)

$$\begin{aligned} \text{X absolut stetig} \Rightarrow P(X = x) &= \lim_{h \downarrow 0} P(x - h < X \leq x + h) = \\ &= \lim_{h \downarrow 0} (F_X(x + h) - F_X(x - h)) = 0 \end{aligned}$$

Wichtige (absolut) stetige Verteilungsfunktionen / Dichten sind:

1. Normalverteilung $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Parameter $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$

Dichte: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

Verteilungsfunktion:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy$$

Standardnormalverteilung: $\mu = 0, \sigma = 1, \text{ d.h. } \mathcal{N}(0, 1)$

Test:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy &\stackrel{\frac{y-\mu}{\sigma}=:u, \frac{du}{dy}=\frac{1}{\sigma}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du}_{=\sqrt{2\pi}} = 1 \end{aligned}$$

2. Exponentialverteilung $\text{Exp}(\lambda)$

Parameter $\lambda > 0.$

Dichte: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , \text{ für } x \geq 0 \\ 0 & , \text{ für } x < 0 \end{cases}$

Verteilungsfunktion:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{für } x \geq 0$$

$$F_X(x) = 0, \quad \text{für } x < 0$$

Die $\text{Exp}(\lambda)$ -Verteilung besitzt die Eigenschaft der sogenannten „Gedächtnislosigkeit“.
D.h. sei $s < t$

$$P(X \geq t \mid X \geq s) = \frac{P(X \geq t, X \geq s)}{P(X \geq s)} = \frac{P(X \geq t)}{P(X \geq s)} = \frac{1 - F_X(t)}{1 - F_X(s)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda(t-s)} = P(X \geq t - s)$$

3. Gleichverteilung $\mathcal{U}([a, b]) = \text{unif}([a, b])$

Dichte: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & , \text{ für } a \leq x \leq b \\ 0 & , \text{ sonst } , a < b \end{cases}$

Verteilungsfunktion:

$$F_X(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dy = \frac{x-a}{b-a} \quad \text{für } a \leq x \leq b$$

4. Cauchyverteilung

Parameter $\alpha \in \mathbb{R}, \beta > 0$

Dichte: $f(x) = \frac{1}{\pi\beta} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x-\alpha}{\beta}\right)^2}$

Zufallsvektoren

Mehrere (zufällige) Merkmale sollen jetzt gleichzeitig untersucht werden.
Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Definition: Es seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

a) Die Abbildung $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ heißt (n-dimensionaler) *Zufallsvektor*.

- b) Die Abbildung $F_X = F_{X_1, \dots, X_n} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ mit $F_X(\vec{x}) = F_X(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$ heißt *Verteilungsfunktion* des Zufallsvektors X oder auch *gemeinsame Verteilung* von $X_1, \dots, X_n$.

Eigenschaften von (n-dimensionalen) Verteilungsfunktionen F_X .

1. $F_X(x) \rightarrow 0$, falls eine Komponente von $\vec{x}$ gegen $-\infty$ geht, während die übrigen Komponenten festgehalten werden.
2. $F_X(x) \rightarrow 1$, falls alle Komponenten von $\vec{x}$ gegen ∞ gehen.
3. $F_X(x)$ ist Δ -monoton in $\vec{x}$, d.h.

$$\vec{x}^{(1)} \leq \vec{x}^{(2)} \text{ (Komponentenweise)}$$

$$\Rightarrow \sum_{\{(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n) \mid \varepsilon_i \in \{1, 2\} \forall i\}} (-1)^{(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n)} F_X(x_1^{(\varepsilon_1)}, \dots, x_n^{(\varepsilon_n)}) \geq 0$$

z.B. $n=2$

$$F_X(x_1^{(2)}, x_2^{(2)}) - F_X(x_1^{(1)}, x_2^{(2)}) - F_X(x_1^{(2)}, x_2^{(1)}) + F_X(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}) \geq 0$$

4. $F_X(\vec{x})$ ist rechtseitig stetig, d.h. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, \vec{x}) > 0$ mit $\vec{x} \leq \vec{y} \leq \vec{x} + \delta \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 0 \leq$

$$F_X(\vec{y}) - F_X(\vec{x}) \leq \varepsilon$$

Beispiel: Ein Experiment (z.B. Würfeln) hat r mögliche Ausgänge $E_1, \dots, E_r$ mit jeweiligen Wahrscheinlichkeiten $p_1, \dots, p_r$, wobei $p_1 + \dots + p_r = 1$.

Dieser Versuch wird n -mal (unabhängig) wiederholt.

Mathematisches Modell:

$$\Omega = \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_i \in \{E_1, \dots, E_r\} \forall i\}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$$

Für $i = 1, \dots, r$ sei $X_i(\omega) = X_i((\omega_1, \dots, \omega_n)) = \text{Anzahl der } E_i\text{-Ausgänge} = \sum_{k=1}^n 1_{\{\omega_k = E_i\}}$

$$P(\{\omega\}) = P(\{(\omega_1, \dots, \omega_n)\}) = p_1^{X_1(\omega)} \cdot \dots \cdot p_r^{X_r(\omega)}$$

Sei nun $k_1, \dots, k_r \in \mathbb{N}_0, k_1 + \dots + k_r = n$

Gesucht ist $P(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r} \cdot \text{Anzahl der } (\omega_1, \dots, \omega_n) \text{ bei denen } k_i \text{ Komponenten den Wert } E_i \text{ haben, } i = 1, \dots, r.$

$$= p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r} \cdot \frac{n!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_r!}$$

$$p_X(k_1, \dots, k_r) = \begin{cases} \frac{n!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_r!} p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r} & , \text{ falls } k_j \in \mathbb{N}_0, k_1 + \dots + k_r = n \\ 0 & , \text{ sonst} \end{cases}$$

ist die Zähldichte der sogenannten *Multinomialverteilung* $\mathcal{M}_{n,r,p_1, \dots, p_r}$

Bemerkung: Für $n = 2$ erhalten wir die Binomialverteilung.

$$^7 X = (X_1, \dots, X_n)$$

$$F_X(\vec{x}) = F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(\{\omega \mid X_1(\omega) \leq x_1\} \cap \{\omega \mid X_2(\omega) \leq x_2\} \cap \dots \cap \{\omega \mid X_n(\omega) \leq x_n\})$$

Definition: Wenn man in einer gemeinsamen Verteilungsfunktion $F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$ bei $(n - 1)$ Variablen x_j den Grenzübergang $x_j \rightarrow \infty$ ausführt, so heißt die entstehende (1-dimensionale) Verteilungsfunktion eine *Randverteilung*.

Lemma 3.2: Die 1-dimensionalen Randverteilungen einer Multinomialverteilung sind Binomialverteilungen.

Definition:

a) Der Zufallsvektor $X = (X_1, \dots, X_n)$ heißt *diskreter Zufallsvektor*, falls X nur abzählbar viele verschiedene Werte annimmt. $p_X(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$ heißt gemeinsame Zähldichte von X .

b) Der Zufallsvektor $X = (X_1, \dots, X_n)$ heißt *absolut stetiger Zufallsvektor*, falls es eine integrierbare Funktion $f_x : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ gibt, so daß

$$F_X(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_x(y_1, \dots, y_n) dy_n, \dots, dy_1$$

Bemerkung:

(i) Hier gilt wieder: $\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_x(y_1, \dots, y_n) dy_n, \dots, dy_1 = 1$

(ii) Die Dichte von X_i (sogenannte *Randdichte*) ist dann

$$f_{X_i}(y_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_x(y_1, \dots, y_n) dy_n \dots dy_{i+1} dy_{i-1} \dots dy_1$$

Beispiel: $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 4x_1x_2 & , \text{ falls } 0 \leq x_1, x_2 \leq 1 \\ 0 & , \text{ sonst} \end{cases}$

$$\text{Test: } \int_0^1 \int_0^1 4x_1x_2 dx_2 dx_1 = \int_0^1 2x_1 [x_2^2]_0^1 dx_1 = [x_1^2]_0^1 = 1$$

$$\text{Randdichte } f_{X_1}(x_1) = \int_0^1 4x_1x_2 dx_2 = 2x_1$$

Beispiel: Der Zufallsvektor (X_1, X_2) heißt *standardnormalverteilt* $\left(\mathcal{N}(\vec{0}, E), \vec{0} = (0, 0), E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$, falls (X_1, X_2) absolut stetig ist mit Dichte

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)\right)$$

Lemma 3.3:

Sei $X = (X_1, \dots, X_n)$ ein absolut stetiger Zufallsvektor mit Dichte f_x und $G \in \mathbb{R}^n$ ein Gebiet. Dann gilt:

$$P(X \in G) = \int_G \cdots \int f_X(\vec{x}) dx_n, \dots, dx_1$$

Beispiel: siehe Beispiel oben

$$\begin{aligned}
 P(X_1 \leq 2X_2) &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{2t_2} 4t_1 t_2 dt_1 dt_2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^1 4t_1 t_2 dt_1 dt_2 \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} 2t_2 [t_1^2]_0^{2t_2} dt_2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 2t_2 [t_1^2]_0^1 dt_2 \\
 &= 2 [t_2^4]_0^{\frac{1}{2}} + [t_2^2]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{7}{8}
 \end{aligned}$$

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Definition: Es seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. $X_1, \dots, X_n$ heißen unabhängige Zufallsvariablen, falls

$$F_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{X_n}(x_n)$$

für alle $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Bemerkung:

(i) Anders ausgedrückt die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig falls

$$P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n \leq x_n).$$

(ii) Ist $(X_1, \dots, X_n)$ ein diskreter Zufallsvektor mit Werten in $M \subset \mathbb{R}^n$, dann sind $X_1, \dots, X_n$ genau dann unabhängig falls

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n = x_n) \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in M.$$

(iii) Ist $(X_1, \dots, X_n)$ ein absolut stetiger Zufallsvektor, dann sind $X_1, \dots, X_n$ genau dann unabhängig, falls

$$f_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{X_n}(x_n) \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

(iv) Sind $X_1, \dots, X_n$ unabhängig, so auch $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ oder auch $h(X_1, X_2), X_3, \dots, X_n$.

Beispiel: 1 Münzwurf.

$$\Omega = \{K, Z\}$$

$$P(\{K\}) = P(\{Z\}) = \frac{1}{2}$$

Definiere 2 Zufallsvariablen X_1 und X_2 wie folgt:

$$X_1(K) = 1, \quad X_1(Z) = -1$$

$$X_2(K) = -1, \quad X_2(Z) = 1$$

$$X_1, X_2 : \Omega \rightarrow \{-1, 1\}$$

Sind X_1 und X_2 unabhängig?

$$\text{Nein, denn } P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0 \neq \frac{1}{4} = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1)$$

Beispiel: Sei (X_1, X_2) ein absolut stetiger Zufallsvektor mit Dichte

$$f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{x_1^2 - 2\rho x_1 x_2 + x_2^2}{1-\rho^2}\right), \quad 0 \leq \rho < 1$$

Die Dichte von X_1 ist dann gegeben durch (Randdichte):

$$\begin{aligned} f_{X_1}(x_1) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) dx_2 \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{x_1^2(1-\rho^2)}{1-\rho^2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x_2 - \rho x_1)^2}{1-\rho^2}\right) dx_2 \end{aligned}$$

Setze $u = \frac{x_2 - \rho x_1}{\sqrt{1-\rho^2}} \Rightarrow \frac{du}{dx_2} = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}$

$$\Rightarrow f_{X_1}(x_1) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} x_1^2\right) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) du}_{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} x_1^2\right)$$

Wegen Symetrie gilt:

$$f_{X_2}(x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} x_2^2\right)$$

Sind die Zufallsvariablen X_1 und X_2 unabhängig?

Es muss gelten $f_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2)$

$$f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)\right)$$

Unabhängigkeit liegt also genau dann vor, wenn $\rho = 0$.

8 Funktionen von Zufallsvariablen und Zufallsvektoren

Lemma 3.4: Sei X eine Zufallsvariable und $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig, $a \neq 0$.

Dann ist $aX + b$ eine Zufallsvariable und es gilt:

$$a) F_{aX+b} = \begin{cases} F_X\left(\frac{x-b}{a}\right) & , \text{ falls } a > 0 \\ 1 - F_X\left(\frac{x-b}{a}\right) + P\left(X = \frac{x-b}{a}\right) & , \text{ falls } a < 0 \end{cases}$$

b) Ist X absolut stetig mit Dichte f_X , so ist auch $aX + b$ absolut stetig mit Dichte

$$f_{aX+b}(x) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{x-b}{a}\right).$$

Beweis:

a) Sei $a > 0$:

$$F_{aX+b}(x) = P(aX + b \leq x) = P\left(X \leq \frac{x-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{x-b}{a}\right).$$

Sei $a < 0$:

$$F_{aX+b}(x) = P(aX + b \leq x) = P\left(X \geq \frac{x-b}{a}\right) = 1 - \underbrace{P\left(X \leq \frac{x-b}{a}\right)}_{F_X\left(\frac{x-b}{a}\right)} + P\left(X = \frac{x-b}{a}\right).$$

b) Sei $x \in \mathbb{R}$. Z.Z.: $\int_{-\infty}^x \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) dt \stackrel{!}{=} F_{aX+b}\left(\frac{x-b}{a}\right)$

Sei $a > 0$:

$$\frac{1}{a} \int_{-\infty}^x f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) dt = \int_{-\infty}^{\frac{x-b}{a}} f_X(u) du = F_X\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

mit $\frac{t-b}{a} =: u \quad \frac{du}{dt} = \frac{1}{a}$

Analog $a < 0$. □

Beispiel: Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, d.h. X hat die Dichte $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Welche Dichte hat $\sigma X + \mu$ mit $\sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}$?

Lemma 3.4 $\Rightarrow f_{\sigma X + \mu}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$

d.h. $\sigma X + \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Lemma 3.5:

a) Sei $X = (X_1, X_2)$ ein absolut stetiger Zufallsvektor mit gemeinsamer Dichte $f_X(x_1, x_2)$.
Dann ist $Z = X_1 + X_2$ eine Zufallsvariable mit Dichte

$$f_Z(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t, x-t) dt$$

Falls X_1 und X_2 unabhängig sind, gilt:

$$f_Z(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1}(t) f_{X_2}(x-t) dt \quad \text{Faltungsformel}$$

b) Sei $X = (X_1, X_2)$ ein diskreter Zufallsvektor mit Werten in $\mathbb{N}_0^2$.

Dann ist $Z := X_1 + X_2$ eine diskrete Zufallsvariable mit

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X_1 = i, X_2 = k-i)$$

Falls X_1 und X_2 unabhängig sind, gilt:

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X_1 = i) P(X_2 = k-i)$$

Beispiel: Es sei $X_1 \sim \Pi(\lambda_1), X_2 \sim \Pi(\lambda_2)$ Poisson verteilt, X_1 und X_2 unabhängig.

Welche Zähldichte hat $X_1 + X_2$?

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = k) &= \sum_{i=0}^k P(X_1 = i) P(X_2 = k-i) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} = \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{1}{k!} \underbrace{\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i}}_{(\lambda_1 + \lambda_2)^k} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} \end{aligned}$$

Also $X_1 + X_2 \sim \Pi(\lambda_1 + \lambda_2)$

Satz 3.5: (Dichtetransformation)

Es sei also $X = (X_1, \dots, X_n)$ ein absolut stetiger Zufallsvektor mit Dichte $f_X(x_1, \dots, x_n)$ und Werten in $S \subset \mathbb{R}^n$. $g = (g_1, \dots, g_n)$ sei eine bijektive Abbildung von S nach $g(S) \subset \mathbb{R}^n$ mit stetigen partiellen Ableitungen und es gelte:

$$J_g(\vec{t}) := \det \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t_1} g_1(\vec{t}) & \dots & \frac{\partial}{\partial t_n} g_1(\vec{t}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial t_1} g_n(\vec{t}) & \dots & \frac{\partial}{\partial t_n} g_n(\vec{t}) \end{pmatrix} \neq 0 \quad \forall \vec{t} \in S$$

dann lautet die Dichte von $Y = g(x)$:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |J_{g^{-1}}(y)| \quad , y \in g(S)$$

Bemerkung: Es gilt $J_{g^{-1}}(y) = \frac{1}{J_g(g^{-1}(y))}$.

Beispiel: Erzeugung von $\mathcal{N}(0, 1)$ -verteilten Zufallsvariablen mit der Box-Muller-Methode. Seien $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ und unabhängig. Dann sind

$$\begin{aligned} X_1 &:= \sqrt{-2 \log(U_1)} \cdot \cos(2\pi U_2) \\ X_2 &:= \sqrt{-2 \log(U_1)} \cdot \sin(2\pi U_2) \end{aligned}$$

unabhängig und $X_1, X_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Beweis: Es sei $\Theta := 2\pi U_2 \Rightarrow \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$

$$\frac{1}{2}V^2 := -\log(U_1) \Rightarrow \frac{1}{2}V^2 \sim \exp(1) \quad \text{vgl. Übungsaufgabe 41}$$

$$\begin{aligned} \text{Also: } X_1 &= V \cdot \cos \Theta = g_1(V, \Theta) \\ X_2 &= V \cdot \sin \Theta = g_2(V, \Theta) \end{aligned}$$

Welche Dichte hat $f_{V,\Theta}(v, \vartheta)$?

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2}V^2 \leq x\right) &= 1 - e^{-x} \Leftrightarrow P\left(V \leq \sqrt{2x}\right) = 1 - e^{-x} \\ &\Rightarrow P(V \leq y) = 1 - e^{-\frac{1}{2}y^2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Dichte von V : $f_V(v) = ve^{-\frac{v^2}{2}}$

Wegen der Unabhängigkeit von Θ und V ist die gemeinsame Dichte

$$f_{V,\Theta}(v, \vartheta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{v^2}{2}} \cdot v & , \text{für } v \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

$$\frac{\partial g_1}{\partial v} = \cos(\vartheta), \frac{\partial g_1}{\partial \vartheta} = -v \sin(\vartheta), \frac{\partial g_2}{\partial v} = \sin(\vartheta), \frac{\partial g_2}{\partial \vartheta} = v \cos(\vartheta)$$

$$\Rightarrow J_g(t) = \det \begin{pmatrix} \cos(\vartheta) & -v \sin(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) & v \cos(\vartheta) \end{pmatrix} = v \cos^2(\vartheta) + v \sin^2(\vartheta) = v$$

und $v = g^{-1}(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$

Nach Satz 3.5 gilt also:

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) &= f_{V, \Theta}(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot e^{-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)} \cdot \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x_1^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}x_2^2} \end{aligned}$$

§4 Charakteristiken von Zufallsvariablen und Zufallsvektoren

4.1 Erwartungswert und Momente von Zufallsvariablen

Definition:

- a) Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $x_1, x_2, \dots$ und einer Zähldichte $p(x_1), p(x_2), \dots$. Dann heißt

$$E(X) := \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p(x_i)$$

Erwartungswert von X , falls $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \cdot p(x_i) < \infty$

- b) Sei X eine absolut stetige Zufallsvariable mit Dichte $f_X(x)$. Dann heißt

$$E(X) := \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

Erwartungswert von X , falls $\int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot f_X(x) dx < \infty$

⁹ Bemerkungen:

- (i) Manchmal sagt man statt Erwartungswert auch Mittelwert der Verteilung.

- (ii) Später werden wir sehen, daß $E(X)$ den langfristigen, durchschnittlichen Ausgang des Zufallsexperiments X beschreibt. D.h. $\frac{1}{n} (X_1, \dots, X_n) \approx E(X)$ für n groß, falls $X_1, \dots, X_n$ unabhängige Wiederholungen von X sind.

Beispiel: 1 mal Würfeln

$\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $X(\omega) = \omega$

Zähldichte: $p(1) = \dots = p(6) = \frac{1}{6}$

Erwartungswert: $E(X) = \sum_{i=1}^6 i \cdot \frac{1}{6} = 3,5$

Beispiel: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Dichte: $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$

$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) dx$

Substitution: $\frac{x-\mu}{\sigma} =: u \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{\sigma}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma u + \mu) \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \sigma u \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du}_{=0(\text{Integrand punktsymmetrisch})} + \mu \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}u^2\right) du}_{=\sqrt{2\pi}} \right) = \mu \end{aligned}$$

Beispiel: Sei $X \sim B_{n,p}$ binomialverteilt

Zähldichte $p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0, \dots, n$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np \cdot \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = \\ &= np \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{(n-1)-k}}_{=1} = np \end{aligned}$$

Lemma 4.1:

a) Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit Werten $x_1, x_2, \dots$ und Zähldichte $p(x_1), p(x_2), \dots$ und $\varphi : \{x_1, x_2, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist $E(\varphi(x)) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(x_i) p(x_i)$, falls $E(\cdot)$ existiert.

b) Ist X eine absolut stetige Zufallsvariable mit Dichte $f_X(x)$ und $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist $E(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f_X(x) dx$, falls $E(\cdot)$ existiert.

Definition: Sei X eine Zufallsvariable.

a) Ist $k \in \mathbb{N}$ und existiert $E(|X|^k)$, dann heißt

$$\mu_k := E(X^k)$$

k-tes Moment von X

b) Ist $k \in \mathbb{N}$ und existiert $E(|X|^k)$, dann heißt

$$\bar{\mu}_k := E((X - \mu_1)^k)$$

k-tes zentriertes Moment von X .

c) $\bar{\mu}_2 = E((X - \mu_1)^2)$ heißt auch *Varianz* von X .

Schreibweise $\text{Var}(x) = \bar{\mu}_2$

$\sigma_X := \sqrt{\text{Var}(x)}$ heißt *Standardabweichung* von X .

Beispiel: 1 mal Würfeln, $X = \text{Augenzahl}$

$$\text{Var}(X) = E((X - 3,5)^2) = \sum_{i=1}^6 (i - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{12}$$

Beispiel: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$E(X) = \mu$ und

$$\text{Var}(X) = E((X - \mu)^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) dx$$

Mit Substitution: $\frac{x-\mu}{\sigma} =: u$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 u^2 \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2 \cdot \int_0^{\infty} \sigma^2 u^2 \exp\left(-\frac{1}{2} u^2\right) du$$

Mit Substitution: $\frac{1}{2}u^2 = t \quad \frac{dt}{du} = u \quad u = \sqrt{2t}$

$$\text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2 \cdot \int_0^{\infty} 2t \exp(-t) \frac{1}{\sqrt{2t}} dt = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2 \cdot \underbrace{\sqrt{2} \int_0^{\infty} \sqrt{t} \exp(-t) dt}_{\Gamma(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}} = \sigma^2$$

Bemerkung: Die Varianz bzw. die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit die Zufallsvariable um den Erwartungswert herum streut.

Lemma 4.2: Sei X eine Zufallsvariable mit $E(|X|^2) < \infty$

a) Dann existiert $\text{Var}(X)$ und es gilt:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

b) Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Beweis:

b) (i) Sei X diskret.

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_{i=1}^{\infty} (ax_i + b)p(x_i) = a \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_i(x_i)}_{=E(X)} + b \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i)}_{=1} \\ &= aE(X) + b \end{aligned}$$

(ii) Sei X stetig.

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_{aX+b}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{x-b}{a}\right) dx \\ &\quad \text{mit Substitution: } \frac{x-b}{a} =: u, \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{a} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (au + b) f_X(u) du \\ &= a \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} u f_X(u) du}_{=E(X)} + b \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) du}_{=1} = aE(X) + b \end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E((X - \mu)^2) = E(X^2 - 2X\mu + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu \underbrace{E(X)}_{=\mu} + \mu^2 \\ &= E(X^2) - \mu^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(aX + b) &= E((aX + b)^2) - (aE(X) + b)^2 \\
 &= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - a^2(E(X))^2 - 2abE(X) - b^2 \\
 &= a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - a^2(E(X))^2 - 2abE(X) - b^2 \\
 &= a^2(E(X^2) - (E(X))^2) = a^2\text{Var}(X)
 \end{aligned}$$

□

4.2 Charakteristiken mehrdimensionaler Verteilungen

Definition:

a) Sei $X = (X_1, \dots, X_n)$ ein diskreter Zufallsvektor mit Werten $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}^n$ und Zähldichte $p_1(x_1), p_2(x_2), \dots$. Weiter sei $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heißt

$$E(\varphi(\vec{x})) := \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(x_i) p(x_i)$$

Erwartungswert von $\varphi(\vec{x})$, falls $\sum_{i=1}^{\infty} |\varphi(x_i)| p(x_i) < \infty$

b) Sei $X = (X_1, \dots, X_n)$ ein absolut stetiger Zufallsvektor mit Dichte $f_X(x_1, \dots, x_n)$. Weiter sei $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Dann heißt

$$E(\varphi(\vec{x})) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x_1, \dots, x_n) f_X(x_1, \dots, x_n) dx_1, \dots, dx_n$$

Erwartungswert von $\varphi(\vec{x})$, falls $E(\varphi(\vec{x})) = \int \dots \int |\varphi(\vec{x})| f_X(\vec{x}) dx_1, \dots, dx_n < \infty$

¹⁰ **Lemma 4.3:** Seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen, deren Erwartungswerte existieren.

a) Dann existiert auch der Erwartungswert von $X_1 + \dots + X_n$ und es gilt:

$$E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$$

b) Sind $X_1, \dots, X_n$ *unabhängig*, dann existiert auch der Erwartungswert von $X_1 \cdot \dots \cdot X_n$ und es gilt:

$$E(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = E(X_1) \cdot \dots \cdot E(X_n)$$

Beweis: o.B.d.A. $n=2$.

Wir betrachten nur den Fall $X = (X_1, X_2)$ ist diskret. X nehme die Werte $(x_1^{(i)}, x_2^{(j)})$ $i, j \in \mathbb{N}$ mit Wahrscheinlichkeit P_{ij} an.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \underbrace{|x_1^{(i)} + x_2^{(j)}|}_{\leq (|x_1^{(i)}| + |x_2^{(j)}|)} P_{ij} &\leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_1^{(i)}| \underbrace{\sum_{j=1}^{\infty} P_{ij}}_{P(X_1=x_1^{(i)})} + \sum_{j=1}^{\infty} |x_2^{(j)}| \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} P_{ij}}_{P(X_2=x_2^{(j)})} \stackrel{\text{n. Vor.}}{<} \infty
 \end{aligned}$$

⇒ Erwartungswert existiert.

¹⁰19.12.2002

$$\begin{aligned}
E(X_1 + X_2) &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (x_1^{(i)} + x_2^{(j)}) P_{ij} \\
&\stackrel{\text{s.O.}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} (x_1^{(i)}) P(X_1 = x_1^{(i)}) + \sum_{j=1}^{\infty} (x_2^{(j)}) P(X_2 = x_2^{(j)}) \\
&= E(X_1) + E(X_2)
\end{aligned}$$

b) Erwartungswert existiert: Nachweis wie in a).

$$\begin{aligned}
E(X_1 \cdot X_2) &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_1^{(i)} x_2^{(j)} P_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_1^{(i)} x_2^{(j)} \cdot P(X_1 = x_1^{(i)}, X_2 = x_2^{(j)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_1^{(i)} x_2^{(j)} \cdot P(X_1 = x_1^{(i)}) \cdot P(X_2 = x_2^{(j)}) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} x_1^{(i)} P(X_1 = x_1^{(i)}) \cdot \sum_{j=1}^{\infty} x_2^{(j)} P(X_2 = x_2^{(j)}) = E(X_1)E(X_2)
\end{aligned}$$

Beispiel: Sei $X \sim B_{n,p}$ binomialverteilt.

$\Rightarrow X = X_1 + \dots + X_n$ wobei $X_i \sim B(1, p)$ $i = 1, \dots, n$ und $X_1, \dots, X_n$ unabhängig.

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot E(X_1) = n \cdot p$$

Definition: Seien X_1, X_2 Zufallsvariablen mit $\mu_1 = E(X_1), \mu_2 = E(X_2)$.

a) Die Kovarianz von X_1 und X_2 ist definiert durch

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E((X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)) = E(X_1 X_2) - \mu_1 \mu_2$$

falls der Erwartungswert existiert.

b) Der Korrelationskoeffizient von X_1 und X_2 ist definiert durch

$$\rho_{X_1, X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)\text{Var}(X_2)}}$$

falls alle auftretenden Erwartungswerte existieren.

c) X_1 und X_2 heißen *unkorreliert*, falls $\rho_{X_1, X_2} = 0$.

Bemerkungen:

(i) Es gilt stets $-1 \leq \rho_{X_1, X_2} \leq 1$.

(ii) Sind X_1, X_2 unabhängig, so sind sie auch unkorreliert, da

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E((X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)) = \underbrace{E(X_1 - \mu_1)}_{=0} \cdot \underbrace{E(X_2 - \mu_2)}_{=0} = 0$$

Die Umkehrung gilt i.a. nicht (siehe Beispiel unten)

(iii) Der Korrelationskoeffizient ist ein Maß für die lineare Abhängigkeit der zwei Zufallsvariablen.

Extremfälle: $X_2 = aX_1 + b$, $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1, X_2) &= E((X_1 - \mu_1)(aX_1 + b - a\mu_1 - b)) = aE((X_1 - \mu_1)^2) \\ &= a\text{Var}(X_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{X_1, X_2} &= \frac{a\text{Var}(X_1)}{\sqrt{\text{Var}(X_1) \cdot a^2 \text{Var}(X_1)}} = 1, \text{ falls } a > 0 \text{ positiv korreliert} \\ &= -1, \text{ falls } a < 0 \text{ negativ korreliert} \end{aligned}$$

Beispiel: X, Y unkorreliert, aber stochastisch abhängig.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$$

ω	$P(\omega)$	$X(\omega)$	$Y(\omega)$	$X(\omega) \cdot Y(\omega)$
ω_1	$\frac{1}{3}$	0	-1	0
ω_2	$\frac{1}{3}$	1	0	0
ω_3	$\frac{1}{3}$	0	1	0

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) = 0$$

Also X, Y unkorreliert.

$$\text{Aber: } \left. \begin{aligned} P(X \leq 0) &= P(\{\omega_1, \omega_3\}) = \frac{2}{3} \\ P(Y \leq 0) &= P(\{\omega_1, \omega_2\}) = \frac{2}{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(X \leq 0, Y \leq 0) \neq P(X \leq 0)P(Y \leq 0)$$

d.h. X, Y sind stochastisch abhängig.

Lemma 4.4: $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen mit $E(X_i^2) < \infty$, $i = 1, \dots, n$

$$\text{a) } \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq n} \text{Cov}(X_j, X_k)$$

b) Falls $X_1, \dots, X_n$ paarweise unkorreliert (oder unabhängig), so gilt:

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

Beweis:

a)

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_1 + \dots + X_n) &= E \left(\left(\sum_{i=1}^n X_i - E(X_i) \right)^2 \right) \\ &= E \left(\left(\sum_{i=1}^n X_i - E(X_i) \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n X_j - E(X_j) \right) \right) \\ &= E \left[\sum_{1 \leq i, j \leq n} (X_i - E(X_i)) (X_j - E(X_j)) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) \end{aligned}$$

b) Hier gilt $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ und b) folgt aus a).

□

Definition: Sei $X = (X_1, \dots, X_n)$ ein n -dimensionaler Zufallsvektor.

a) Falls $E(X_1), \dots, E(X_n)$ existieren, so heißt

$$\vec{\mu}_X = (E(X_1), \dots, E(X_n))$$

der Erwartungswertvektor von X .

b) Falls $E(X_1^2), \dots, E(X_n^2)$ existieren, dann heißt

$$\text{Cov}(X) = \text{Cov}((X_1, \dots, X_n)) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \dots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \dots & \text{Cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix}$$

Kovarianzmatrix von X .

Beispiel: (2-dimensionale Normalverteilung)

Sei $\mu = (\mu_1, \mu_2) \in \mathbb{R}^2$ und $C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2\rho \\ \sigma_1\sigma_2\rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$ mit $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, $0 \leq \rho \leq 1$

Die Dichte einer 2-dimensionalen Normalverteilung ist gegeben durch

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\left(\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2 \right)\right)$$

Man schreibt auch $X = (X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(\mu, C)$. Dann gilt:

Randverteilung: $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$

$X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$

Erwartungswertvektor: $\vec{\mu}_x = (\mu_1, \mu_2)$

Kovarianzmatrix: $\text{Cov}(X) = C$.

§5 Abschätzung für Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeiten

¹¹**Satz 5.1:** (Ungleichung von Cauchy-Schwarz)

Seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit $E[X^2], E[Y^2] < \infty$.

Dann gilt:

$$|E[XY]|^2 \leq E[X^2] \cdot E[Y^2]$$

Anwendung: Es gilt stets: $|\rho_{X,Y}| = \left| \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \right| \leq 1$

oder umgeformt: $(\text{Cov}(X, Y))^2 \leq \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$

$$\begin{aligned} (\text{Cov}(X, Y))^2 &= \underbrace{E[(X - E(X))(Y - E(Y))]}_{=\tilde{X}}^2 \leq E[(X - E(X))^2] \cdot E[(Y - E(Y))^2] \\ &= \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y) \end{aligned}$$

Satz 5.2: (Ungleichung von Chebyshev)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E[|X|] < \infty$ und $\varepsilon > 0$ beliebig.

Dann gilt:

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|)}{\varepsilon}$$

Bemerkung:

(i) Wende Satz 5.2 an auf $|X|^m, \varepsilon^m$ mit $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} P(|X|^m \geq \varepsilon^m) &\leq \frac{E(|X|^m)}{\varepsilon^m} \\ \Rightarrow P(|X| \geq \varepsilon) &\leq \frac{E(|X|^m)}{\varepsilon^m} \quad \text{mit } m \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Diese Version nennt man auch *Markovsche Ungleichung*.

(ii) Ist $\text{Var}(X) < \infty$, so folgt aus (i) mit $m = 2$:

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X - E(X)|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Beweis von Satz 5.2: Wir betrachten nur den Fall, daß X eine Dichte $f_X(x)$ hat:

$$\begin{aligned} E(|X|) &= \int_{-\infty}^{\infty} |x|f_X(x)dx \geq \int_{-\infty}^{-\varepsilon} |x|f_X(x)dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} |x|f_X(x)dx \\ &\geq \varepsilon \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} f_X(x)dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} f_X(x)dx \right) \\ &= \varepsilon (P(X \leq -\varepsilon) + P(X \geq \varepsilon)) \\ &= \varepsilon P(|X| \geq \varepsilon) \quad \square \end{aligned}$$

¹¹09.01.2003

Beispiel: Wir würfeln n mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Zahl, die im Durchschnitt gewürfelt wurde um mehr als 10% von 3,5 abweicht?

Seien $X_1, \dots, X_n$ die Augenzahlen der n Versuche, d.h.

$P(X_i = k) = \frac{1}{6}$ für $i = 1, \dots, n$, $k = 1, \dots, 6$ und die $X_1, \dots, X_n$ sind unabhängig.

Gesucht ist $P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 3,5| \geq 0,35)$!

Nach Bemerkung (ii) ist diese Wahrscheinlichkeit

$$P(\cdot) \leq \frac{\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{(0,35)^2} = \frac{\frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)}{(0,35)^2} = \frac{\frac{1}{n} \text{Var}(X_i)}{(0,35)^2} = \frac{100^2}{n \cdot 12 \cdot 35}$$

z.B. $n = 100$: $\approx 0,238$

Weitere Anwendung von Satz 5.2:

$\text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow X = \mu$ für ein $\mu \in \mathbb{R}$.

„ $\Rightarrow$ “ $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq 0$, also $= 0 \quad \forall \varepsilon > 0$

Da ε beliebig, muss $X \equiv \mu$ sein.

„ $\Leftarrow$ “ $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \mu^2 - \mu^2 = 0$

§6 Erzeugende Funktionen

Im folgenden betrachten wir nur Zufallsvariablen mit Werten in $\mathbb{N}_0$.

Definition: Sei X eine Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{N}_0$ und Zähldichte $p(k)$, $k \in \mathbb{N}_0$, d.h. $p(k) = P(X = k)$. Dann heißt die Funktion $g_X : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g_X(z) := \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = E[z^X]$$

erzeugende Funktion von X .

Bemerkungen:

- (i) $g_X(z)$ ist wohldefiniert für $|z| \leq 1$, weil $\left| \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} p_k |z^k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$
- (ii) Insbesondere gilt: $g_X(1) = 1$
- (iii) $g_X^{(n)}(z)$ ist wohldefiniert auf $(-1, 1)$, $n \in \mathbb{N}$.
- (iv) Wir schreiben $g_X^{(n)}(z-)$ und meinen $\lim_{t \uparrow z} g_X^{(n)}(t)$
- (v) Es gilt: $P(X = k) = p(k) = \frac{g_X^{(k)}(0)}{k!}$

Satz 6.1: Besitzt die Zufallsvariable X die erzeugende Funktion $g_X(z)$ so gilt:

- a) $E(X) = g'_X(1-)$, falls $E(X)$ existiert.
- b) $\text{Var}(X) = g''_X(1-) + g'_X(1-) - (g'_X(1-))^2$, falls $\text{Var}(X)$ existiert.

Beweis:

a) $g'_X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot k \cdot z^{k-1} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot k = E(X)$ für $z \rightarrow 1$.

b) ähnlich $\square$

Beispiel: Sei $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Also $p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ für $k = 0, 1, \dots, n$

$$g_X(z) = \sum_{k=0}^n \underbrace{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{\binom{n}{k} (pz)^k (1-p)^{n-k}} \cdot z^k = (pz + 1 - p)^n, \quad \forall |z| \leq 1$$

$$\Rightarrow E(X) = g'_X(1-) = n(pz + 1 - p)^{n-1} \cdot p \Big|_{z \rightarrow 1} = n \cdot 1 \cdot p = np$$

$$\text{Und: } g''_X(1-) = n(n-1)(pz + 1 - p)^{n-2} p^2 \Big|_{z \rightarrow 1} = n(n-1)p^2$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = n^2 p^2 - np^2 + np - n^2 p^2 = np(1-p)$$

Satz 6.2: (Eindeutigkeitssatz für erzeugende Funktionen)

Seien X und Y zwei Zufallsvariablen mit Werten in $\mathbb{N}_0$ und Verteilungsfunktionen F_X und F_Y und erzeugenden Funktionen g_x und g_Y . Dann gilt:

$$F_X(x) = F_Y(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow g_X(z) = g_Y(z) \quad \forall z \in [-1, 1]$$

Beweis: Identitätssatz für Potenzreihen.

Satz 6.3: Seien X und Y zwei *unabhängige* Zufallsvariablen mit Werten in $\mathbb{N}_0$. Dann gilt für die erzeugenden Funktionen:

$$g_{X+Y}(z) = g_X(z) \cdot g_Y(z)$$

Beweis: Es gilt: $g_{X+Y}(z) = E[z^{X+Y}] = E[z^X \cdot z^Y] = E[z^X] E[z^Y] = g_X(z) \cdot g_Y(z)$ $\square$

Beispiel: Seien $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ und X und Y sind unabhängig. Nach dem letzten Beispiel gilt: $g_X(z) = (pz + 1 - p)^n$ und $g_Y(z) = (pz + 1 - p)^m$

$$\text{Satz 6.3} \Rightarrow g_{X+Y} = g_X(z) \cdot g_Y(z) = (pz + 1 - p)^{n+m} \Rightarrow X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$$

¹² **Satz 6.4:** (Stetigkeitssatz für erzeugende Funktionen)

Gegeben sei eine Folge von Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots$ mit Werten in $\mathbb{N}_0$ und Zähldichte $\left(p_1^{(k)}\right)_{k \in \mathbb{N}_0}, \left(p_2^{(k)}\right)_{k \in \mathbb{N}_0}, \dots$. Dann gilt:

a) $(g_{X_n}(z))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert auf $(0, 1)$ $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(k) = p(k)$ existiert $\forall k \in \mathbb{N}_0$

b) Falls $g_{X_n}(z)$ auf $(0, 1)$ konvergiert, so gegen $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p(k)z^k$.

Beispiel: (Grenzwertsatz von Poisson, vergleiche Lemma 3.1 [Seite 13])

Sei $X \sim B(n, \frac{\lambda}{n})$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq \lambda > 0$.

Die erzeugende Funktion von X_n ist (siehe Beispiel [Seite 33]):

$$g_{X_n}(z) = \left(z \cdot \frac{\lambda}{n} + 1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{\lambda}{n}(z - 1)\right)^n$$

Also gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} g_{X_n}(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\lambda}{n}(z - 1)\right)^n = e^{\lambda(z-1)}$

Nach Lemma 3.1 und Satz 6.4 müßte das jetzt die erzeugende Funktion einer Poisson-Verteilung mit Parameter λ sein.

$$g_X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda z)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda z} = e^{\lambda(z-1)}$$

Also folgt nach Satz 6.4 $p_n(k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k \in \mathbb{N}_0$

Im folgenden sei jetzt X wieder eine beliebige Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{R}$. Anstatt der erzeugenden Funktion betrachten wir hier die sogenannte charakteristische Funktion.

Definition: Sei X eine beliebige Zufallsvariable mit Werten in $\mathbb{R}$. Dann heißt die Funktion $\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\varphi_X(t) := E[e^{itX}]$ *charakteristische Funktion* von X .

Bemerkung:

(i) Es gilt: $\varphi_X(t) = E[\cos(tX)] + iE[\sin(tX)] \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

(ii) $\varphi_X(0) = 1$ und $|\varphi_X(t)| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

(iii) Falls X Werte in $\mathbb{N}_0$ annimmt, gilt: $\varphi_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{itn} P(X = n)$.

(iv) Falls X absolut stetig ist mit Dichte $f_X(x)$ gilt:

$$\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx.$$

Beispiel: $X(\omega) = \mu$.

$$\varphi_X(t) = E[e^{it\mu}] = e^{it\mu}$$

Beispiel: $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

X besitzt die Dichte $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} dx = \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} h(t)$$

$$\text{mit } h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} dx$$

$$\text{Wir differenzieren } h: \quad h'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} \left(-\frac{1}{2} \cdot 2(x-it)(-i)\right) dx = -ie^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$\Rightarrow h(t) \equiv \text{const.} \quad \text{Außerdem ist } \varphi_X(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} h(0) = 1 \Rightarrow h(t) \equiv \sqrt{2\pi}$$

$$\text{Insgesamt: } \varphi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Lemma 6.5: Für jede Zufallsvariable X und Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\varphi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \varphi_X(at)$$

Beweis: $\varphi_{aX+b}(t) = E[e^{it(aX+b)}] = E[e^{itb} e^{itaX}] = e^{itb} \varphi_X(at)$. $\square$

Beispiel: Ist $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, so ist $Y := \sigma X + \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ für $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$.

$$\Rightarrow \varphi_Y(t) = e^{it\mu} \varphi_X(\sigma t) = e^{it\mu} e^{-\frac{(\sigma t)^2}{2}}$$

Lemma 6.6: Sei $m \in \mathbb{N}$ und X eine Zufallsvariable. Falls $E[|X|^m] < \infty$ folgt:

$$\varphi_X^{(m)}(t) \text{ existiert und } \varphi_X^{(m)}(0) = i^m E[X^m]$$

Beweis: Es gilt $\varphi_X^{(m)}(t) = E[(iX)^m e^{itX}]$. Setze $t = 0 \Rightarrow$ Behauptung $\square$

Beispiel: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Dann ist die charakteristische Funktion gegeben durch (siehe oben):

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \exp\left(it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) \\ \Rightarrow \varphi_X'(t) &= \varphi_X(t)(i\mu - \sigma^2 t) \\ \Rightarrow \varphi_X'(0) &= 1 \cdot i\mu = i \cdot E[X] \Rightarrow E[X] = \mu. \\ \varphi_X''(t) &= \varphi_X(t)(i\mu - \sigma^2 t)^2 + \varphi_X(t)(-\sigma^2) \\ \Rightarrow \varphi_X''(0) &= (i\mu)^2 - \sigma^2 = -(\mu^2 + \sigma^2) = \underbrace{i^2}_{=-1} E[X^2] \\ \Rightarrow E[X^2] &= \mu^2 + \sigma^2 \\ \Rightarrow \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = \mu^2 + \sigma^2 - \mu^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

Satz 6.7: (Eindeutigkeitsatz)

Seien X und Y Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion F_X und F_Y , sowie charakteristischen Funktionen φ_X und φ_Y . Dann gilt:

$$F_X(t) = F_Y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \varphi_X(t) = \varphi_Y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Satz 6.8: (Stetigkeitssatz)

Seien $X, X_1, X_2, \dots$ Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktionen $F_X, F_{X_1}, F_{X_2}, \dots$ sowie charakteristischen Funktionen $\varphi_X, \varphi_{X_1}, \varphi_{X_2}, \dots$. Dann sind die beiden folgenden Aussagen äquivalent:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{X_n}(t) = \varphi_X(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x) \quad x \in \mathbb{R},$ in denen die Grenzfunktion F_X stetig ist.

Eine typische Anwendung von charakteristischen Funktionen ist die Bestimmung der Faltung, also der Verteilungsfunktion von $X + Y$, wobei X und Y unabhängig sind.

Satz 6.9: Sind X und Y unabhängige Zufallsvariablen, so gilt:

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Beweis: $E[e^{it(X+Y)}] = E[e^{itX}e^{itY}] = E[e^{itX}]E[e^{itY}]. \quad \square$

Beispiel: Sei $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2), X$ und Y unabhängig.

$$\varphi_{X+Y}(t) = \exp\left(it\mu_1 - \frac{(\sigma_1 t)^2}{2}\right) \exp\left(it\mu_2 - \frac{(\sigma_2 t)^2}{2}\right) = \exp\left(it(\mu_1 + \mu_2) - \frac{1}{2}t^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)\right)$$

$$\Rightarrow X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

§7 Grenzwertsätze

7.1 Der zentrale Grenzwertsatz

¹³Es seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_1) = \mu < \infty$ und $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Wir betrachten jetzt die folgende Zufallsvariable:

$$T_n := \frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot \mu}{\sigma \sqrt{n}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Die Zufallsvariablen T_n sind standardisiert im folgenden Sinne:

$$E(T_n) = \frac{1}{\sigma \sqrt{n}} \left(\underbrace{E(X_1) + \dots + E(X_n)}_{n \cdot \mu} - n\mu \right) = 0$$

$$\text{Var}(T_n) = \frac{1}{\sigma^2 n} \left(\underbrace{\text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)}_{n \cdot \sigma^2} \right) = 1$$

Satz 7.1: (Zentraler Grenzwertsatz)

Seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_1) = \mu < \infty$ und $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$, so gilt für $T_n := \frac{X_1 + \dots + X_n - n \cdot \mu}{\sigma \sqrt{n}}$

$$F_{T_n}(x) = P(T_n \leq x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x) = F_X(x) \text{ mit } X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

für $n \rightarrow \infty$ und $\forall x \in \mathbb{R}$.

Beweis: Wir betrachten zunächst den Fall $\mu = 0, \sigma^2 = 1$

Dann ist $T_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} =: \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ und es gilt:

$$\varphi_{T_n}(t) \stackrel{L.6.5}{=} \varphi_{S_n} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \stackrel{S.6.9}{=} \left[\varphi_{X_1} \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n$$

$\varphi_{X_1}(t)$ kann man jetzt in eine Taylor-Reihe um $t = 0$ entwickeln:

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1}(t) &= \varphi_{X_1}(0) + \varphi'_{X_1}(0)t + \varphi''_{X_1}(0)\frac{t^2}{2} + R_t \quad \text{mit } \frac{R_t}{t^2} \rightarrow 0 \text{ für } t \rightarrow 0. \\ &= 1 + it\mu - \frac{t^2}{2}E[X^2] + R_t \end{aligned}$$

$$\text{Also: } \varphi_{T_n}(t) = \left[1 - \frac{t^2}{n \cdot 2} \cdot 1 + R \left(\frac{t}{\sqrt{n}} \right) \right]^n \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

$e^{-\frac{t^2}{2}}$ ist aber die charakteristische Funktion von $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Damit folgt die Behauptung aus dem Stetigkeitssatz (Satz 6.8 [Seite 36]) für charakteristische Funktionen.

Ist $\mu \neq 0$ und $\sigma^2 \neq 1$, so definiere $Y_n := \frac{X_n - \mu}{\sigma}$, $n \in \mathbb{N}$.

Hier gilt $E(Y_n) = 0$ und $\text{Var}(Y_n) = 1$. Außerdem:

$T_n = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{\sqrt{n}}$ und die Behauptung folgt aus dem ersten Fall. □

Korollar 7.2: Unter den Voraussetzungen von Satz 7.1 [Seite 39] gilt für $\alpha < \beta$:

$$P\left(\alpha \leq \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq \beta\right) \rightarrow \Phi(\beta) - \Phi(\alpha) \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Beweis: Linke Seite:

$$F_{T_n}(\beta) - F_{T_n}(\alpha - \epsilon) = I_n, \quad \begin{array}{ccccccc} F_{T_n}(\beta) & - & F_{T_n}(\alpha) & \leq & I_n & \leq & F_{T_n}(\beta) - F_{T_n}(\alpha - \epsilon) & \forall \epsilon > 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & \downarrow \\ n \xrightarrow{S.7.1} \infty & & \Phi(\beta) & & \Phi(\alpha) & & \Phi(\beta) & \Phi(\alpha - \epsilon) \end{array}$$

$\epsilon \rightarrow 0$ liefert die Behauptung. $\square$

Beispiel: $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$ seien unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$P(X_1 = 1) = \frac{1}{5}, P(X_1 = 3) = \frac{1}{4}, P(X_1 = 6) = \frac{2}{5}, P(X_1 = 11) = \frac{3}{20}$$

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß $S_{1000} = \sum_{j=1}^{1000} X_j$ einen Wert zwischen 4820 und 5180

annimmt?

$$\mu = E(X_1) = \frac{1}{5} + \frac{3}{4} + 6 \cdot \frac{2}{5} + 11 \cdot \frac{3}{20} = 5$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = \frac{21}{5}$$

$$\begin{aligned} P(4820 \leq S_{1000} \leq 5180) &= P(-180 \leq S_{1000} - 5000 \leq 180) \\ &= P\left(\frac{-180}{\sqrt{1000 \cdot \frac{21}{5}}} \leq \frac{S_{1000} - 5000}{\sqrt{1000 \cdot \frac{21}{5}}} \leq \frac{180}{\sqrt{1000 \cdot \frac{21}{5}}}\right) \\ &\approx \Phi(0,57) - \Phi(-0,57) = 0,4314 \end{aligned}$$

Beispiel: $X_1, X_2, \dots$ seien unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_1 \sim B(1, p)$, also $P(X_1 = 1) = p$ und $P(X_1 = 0) = 1 - p$

Wir haben $\mu = E(X_1) = p$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = p(1 - p)$

Sei $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Dann gilt nach dem zentralen Grenzwertsatz

$$P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{n \cdot (1 - p)}} \leq x\right) \rightarrow \Phi(x) \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow P\left(S_n \leq np + x\sqrt{np(1 - p)}\right) \rightarrow \Phi(x) \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Da $S_n \sim B(n, p)$ gilt:

$$\sum_{k \leq np + x\sqrt{np(1-p)}} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \Phi(x) \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Grenzwertsatz von DeMoivre-Laplace

Beispiel: Prüfen einer Hypothese

Ein Würfel wird 1000 mal geworfen. Dabei fällt 120 mal die Eins. Ist der Würfel gezinkt?

Vorgehen: Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit dafür, daß höchstens 120 mal die Eins fällt.

Ist diese Wahrscheinlichkeit sehr klein, darf man annehmen, daß der Würfel gezinkt ist.

Wir definieren folgende Zufallsvariable:

$$X_k = \begin{cases} 1 & , \text{ falls im } k\text{-ten Wurf eine Eins fällt} \\ 0 & , \text{ falls im } k\text{-ten Wurf keine Eins fällt} \end{cases} \quad k = 1, \dots, 1000$$

Wir nehmen an, daß die $X_1, \dots, X_{1000}$ unabhängig und $P(X_1 = 1) = \frac{1}{6}, P(X_1 = 0) = \frac{5}{6}$.
 $\Rightarrow E(X_1) = \frac{1}{6}, \text{Var}(X_1) = \frac{5}{36}$

Zentraler Grenzwertsatz: $S_{1000} = X_1, \dots, X_{1000}$

$$P\left(\frac{S_{1000} - \frac{1000}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}} \leq \underbrace{\frac{120 - \frac{1000}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}}}_{-\frac{28}{\sqrt{50}} \approx -4}\right) \approx \Phi(-4) \leq 10^{-6}$$

$$P(S_{1000} \leq 120) \leq 10^{-6}$$

Wir können also annehmen, daß der Würfel gezinkt ist.

Bemerkung:

Die Zahl $x_q \in \mathbb{R}$ die $\Phi(x_q) = q$ erfüllt mit $q \in (0, 1)$ heißt q-Quantil der Standardnormalverteilung.

Satz 7.3: (Berry Esséen)

Sind die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots$ unabhängig und identisch verteilt mit $\mu = E(X_1) < \infty$ und $|\mu|_3 := E(|X_1 - \mu|^3) < \infty$, so gilt:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_{T_n}(x) - \Phi(x)| \leq \frac{|\mu|_3}{\sigma^3 \sqrt{n}}$$

7.2 Gesetze der großen Zahlen

¹⁴ **Satz 7.4:** (Schwaches Gesetz der großen Zahlen)

Sind die identisch verteilten Zufallsvariablen X_1, X_2 unabhängig und existiert ihr Erwartungswert $\mu = E(X_1)$, so gilt $\forall \varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

Beweis: Geht mit charakteristischen Funktionen und den Sätzen 6.7 und 6.8 [Seite 36].

Falls zusätzlich $\text{Var}(X_1) < \infty$, dann ist der Beweis einfacher:

Wir verwenden die Ungleichung von Chebyshev:

$$E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} (E(X_1) + \dots + E(X_n)) = E(X_1) = \mu$$

$$\text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} (\text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)) = \frac{1}{n} \text{Var}(X_1)$$

Also:

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(X_1)}{n \cdot \varepsilon^2} \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty. \quad \square$$

¹⁴30.01.2003

Satz 7.5: (Starkes Gesetz der großen Zahlen)

Sind die identisch verteilten Zufallsvariablen X_1, X_2 unabhängig und existiert ihr Erwartungswert $\mu = E(X_1)$, so gilt:

$$P\left(\left\{\omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)}{n} = \mu\right\}\right) = 1$$

Schreibweise: $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mu$ für $n \rightarrow \infty$ fast sicher.

Anwendungsbeispiel: Monte Carlo Simulation

Es sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion.

$M := \max_{X \in [0,1]} f(x)$ sei der maximal angenommene Wert.

Wir wollen $\int_0^1 f(x) dx$ numerisch näherungsweise berechnen.

Dazu sei $U_1, U_2, \dots$ eine Folge von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

Weiter sei $V_1, V_2, \dots$ eine Folge unabhängiger und identisch verteilter Zufallsvariablen mit $V_1 \sim \mathcal{U}(0, M)$.

Wir setzen: $I_k := \begin{cases} 1 & \text{falls } f(U_k) > V_k \\ 0 & \text{falls } f(U_k) \leq V_k \end{cases}$

Dann gilt: $I_1, I_2, \dots$ ist eine Folge von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit

$$\begin{aligned} E[I_1] &= 1 \cdot P(f(U_1) > V_1) + 0 \cdot P(\dots) = P((U_1, V_1) \in G) = \\ &= \int_0^1 \int_0^{f(x)} 1 \cdot dy dx = \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

Aus dem starken Gesetz der großen Zahlen folgt also:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n I_k \rightarrow \int_0^1 f(x) dx \text{ für } n \rightarrow \infty \text{ fast sicher.}$$

Anwendungsbeispiel aus der Zahlentheorie

Es sei $\Omega = [0, 1]$ und $\omega \in \Omega$.

Wir betrachten die Dualbruchzerlegung von ω , d.h. wir schreiben $\omega = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{w_i}{2^i}$ mit $w_i \in \{0, 1\}$, wobei $\omega = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{w_i}{2^i}$

Weiter seien die Zufallsvariablen $X_1, X_2 : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ definiert durch

$$X_n(\omega) = X_n(0, \omega_1 \omega_2 \dots) = \omega_n \text{ für } n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} \text{und } A_n &= \{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) = x_1, \dots, X_n(\omega) = x_n\} \text{ für feste } x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\}. \\ &= \left\{ \omega \in \Omega \mid \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{2^n} \leq \omega < \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2^2} + \dots + \frac{x_n}{2^n} + \frac{1}{2^n} \right\} \end{aligned}$$

Wir nehmen an, daß $P([a, b]) = b - a$, für $0 \leq a < b \leq 1$, also $P(A_n) = \frac{1}{2^n}$

$$\Rightarrow P(X_1 = 0) = P\left(\left\{\omega \in \Omega \mid \frac{0}{2} \leq \omega < \frac{0}{2} + \frac{1}{2}\right\}\right) = \frac{1}{2}$$

$$P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

$$P(X_2 = 0) = P(X_2 = 0, X_1 = 0) + P(X_2 = 0, X_1 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

und $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{1}{4} = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2)$ für $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ etc.

Also sind die Zufallsvariablen $X_1, X_2, \dots$ unabhängig und identisch verteilt mit

$$P(X_k = 0) = P(X_k = 1) = \frac{1}{2} \text{ und } E(X_k) = \frac{1}{2}$$

Nach Satz 7.5 [Seite 40] gilt: $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n I_{[X_k=1]} \rightarrow \frac{1}{2}$ fast sicher für $n \rightarrow \infty$.

d.h. fast alle Zahlen des Intervalls $[0, 1]$ (bis auf eine Menge $A \subset [0, 1]$ mit $P(A) = 0$) sind in dem Sinne normal, daß der Anteil der Nullen und Einsen in ihrer Dualbruchzerlegung gegen $\frac{1}{2}$ konvergiert.

§8 Erzeugung von Zufallszahlen

Grundlagen für die Erzeugung von sogenannten Pseudo-Zufallszahlen, die Realisierungen einer bestimmten Verteilungsfunktion F_X seien sollen, ist die Erzeugung von $(0, 1)$ -gleichverteilten Zufallszahlen.

Erzeugung von $(0,1)$ -gleichverteilten Zufallszahlen:

Dies geschieht zum Beispiel mit dem linearen Kongruenzgenerator.

Es sei $v_0 \in \mathbb{N}$, $a, m \in \mathbb{N}$, m eine Primzahl und $c \in \{0, 1, \dots, m-1\}$

Dann liefert die Folge (u_n) mit

$$v_n = (a \cdot v_{n-1} + c) \bmod m$$

$$u_n = \frac{v_n}{m}$$

eine Realisierung einer Folge von unabhängigen, $(0,1)$ -gleichverteilten Zufallsvariablen. Ein guter Generator zeichnet sich dadurch aus, daß n -Tupel von erzeugten Zahlen nicht auf Hyper-ebenen liegen.

„gute Werte“ erhält man z.B. für $v_0 = 100000$, $m = 2^{31} - 1$, $a = 950706376$

Aus diesem $(0,1)$ -gleichverteilten Zufallszahlen kann man nun Zufallszahlen für andere Verteilungen konstruieren.

Diskrete Zufallsvariablen

Sei X eine diskrete Zufallsvariable mit $P(X = x_i) = p_i$, $i = 1, \dots, k$

(U_n) sei eine Folge von unabhängigen, $(0,1)$ -gleichverteilten Zufallsvariablen.

Das Ziel ist daraus Zufallsvariablen (Z_n) zu konstruieren mit $F_z = F_X$.

Einfache Methode:

Sollen viele Zufallszahlen erzeugt werden, ist folgender Algorithmus besser geeignet:

Alias Algorithmus

Schritt 0: o.B.d.A. $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$.

Bestimme h mit $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_h \leq \frac{1}{k} < p_{h+1} \leq \dots \leq p_k$.

FOR $i = 1, \dots, k$ DO

$r_i := p_i$; $a_i := 0$;

FOR $i = 1, \dots, k$ DO

IF $r_i < \frac{1}{k}$ THEN $a_i := h + 1$; $r_{h+1} := r_{h+1} - (\frac{1}{k} - r_i)$;

IF $r_{h+1} \leq \frac{1}{k}$ THEN $h := h + 1$

Schritt 1: FOR $i = 1, 2, \dots$ DO

Erzeuge $u_i \sim \mathcal{U}(0, 1)$;

$j := \lfloor k \cdot u_i \rfloor + 1$;

$d := j - k u_i$;

IF $d \leq k \cdot r_j$ THEN $z_i := x_j$;

ELSE $z_i := x_{a_j}$;

Vorteil: In Schritt 0 werden nur einmal die Werte r_i und a_i bestimmt. Bei der eigentlichen Erzeugung der Zufallszahlen in Schritt 1 ist nur ein einfacher Vergleich nötig.

Beispiel:

Sei $p_1 = 0.1, p_2 = 0.2, p_3 = 0.3, p_4 = 0.4, k = 4$

$$\frac{1}{k} = 0.25 \Rightarrow h = 2$$

$$\begin{aligned} \text{i=1: } r_1 = p_1 = 0.1 < 0.25 &\Rightarrow a_1 := 3; r_3 := 0.3 - (0.25 - 0.1) = 0.15 \\ r_3 = 0.15 \leq 0.25 &\Rightarrow h := 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i=2: } r_2 = p_2 = 0.2 < 0.25 &\Rightarrow a_2 := 4; r_4 := 0.4 - (0.25 - 0.2) = 0.35 \\ r_4 = 0.35 \not\leq 0.25 & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i=3: } r_3 = p_3 = 0.15 < 0.25 &\Rightarrow a_3 := 4; r_4 := 0.35 - (0.25 - 0.15) = 0.25 \\ r_4 = 0.25 \leq 0.25 &\Rightarrow h := 4 \end{aligned}$$

$$\text{i=4: } r_4 = 0.25 \not\leq 0.25$$

Also: $r_1 = 0.1, r_2 = 0.2, r_3 = 0.15, r_4 = 0.25$
 $a_1 = 3, a_2 = 4, a_3 = 4, (a_4 = 0)$

Poisson-Verteilung

Seien $U_1, U_2, \dots$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $U_i \sim \mathcal{U}(0, 1), \alpha = 0$.
Dann ist

$$X := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \prod_{k=1}^n U_k < e^{-\alpha} \right\} - 1$$

Poisson-verteilt mit Parameter α .

stetige Zufallsvariablen

Sei X eine Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$.

Die Funktion $F_X^{-1} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ mit

$$F_X^{-1} = \begin{cases} \inf\{t \in \mathbb{R} \mid F_X(t) \geq x\} & \text{für } x \in [0, 1] \\ \sup\{t \in \mathbb{R} \mid F_X(t) = 0\} & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

ist die sogenannte *Quantilfunktion*.

Ist $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, dann ist $F_X^{-1}(U)$ verteilt wie X . (Inversionsmethode) (vgl. Aufgabe 41).

Ist F_X invertierbar, ist F_X^{-1} die übliche Inverse.

z.B. falls $X \sim \exp(\lambda)$ ist $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$ und $F_X^{-1}(y) = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - y)$

Ist $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, so ist $-\frac{1}{\lambda} \log(U) \sim \exp(\lambda)$ (vgl. Aufgabe 41)

Normalverteilung

Für die Normalverteilung gibt es eine Reihe von verschiedenen Verfahren. Eines davon ist die sogenannte Box-Muller-Methode.

Seien U_1, U_2 unabhängig und identisch verteilt mit $U_k \sim \mathcal{U}(0, 1), k = 1, 2$. Dann sind

$$X_1 := \sqrt{-2 \log(U_1)} \cdot \cos(2\pi U_2)$$

$$X_2 := \sqrt{-2 \log(U_1)} \cdot \sin(2\pi U_2)$$

unabhängig und $X_1, X_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ verteilt.

§9 Randomisierte Algorithmen

Hier werden im Laufe des Verfahrens zufällige Entscheidungen getroffen.

Las Vegas-Algorithmen

Liefere mit Wahrscheinlichkeit 1 das richtige Ergebnis, Laufzeit ist zufällig.

Monte Carlo-Algorithmen

Liefere mit Wahrscheinlichkeit < 1 das richtige Ergebnis. Sicherheit kann aber auf Kosten der Laufzeit beliebig groß gemacht werden.

Randomisiertes Quicksort

Aufgabe: Eine Menge von n verschiedenen Zahlen soll sortiert werden.

Üblicher Quicksort Algorithmus:

IF $|M| \in \{0, 1\}$ THEN Stop!

ELSE Wähle $x^* \in M$ (Discriminator)

Vergleiche jedes Element von $M - \{x^*\}$ mit x^*

Teile $M - \{x^*\}$ in $L := \{x \in M \mid x < x^*\}$ und $U := \{x \in M \mid x > x^*\}$

Sortiere L, U .

Der Algorithmus hat die längste Laufzeit, wenn x^* immer das kleinste oder größte Element ist.

Die Anzahl der Vergleiche beträgt hier: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$

Randomisierung: Wähle x^* zufällig, gleichverteilt auf M .

Der randomisierte Quicksort-Algorithmus ist also ein Las Vegas-Algorithmus.

T_n = Anzahl der Vergleiche bei einem Feld der Größe n .

$E[T_n] = ?$

Satz 9.1: Die erwartete Anzahl von Vergleichen beim randomisierten Quicksort ist asymptotisch.

$$E[T_n] \sim 2n \log(n)$$

$$\left(\text{d.h. } \frac{E[T_n]}{2n \log(n)} \rightarrow \text{const für } n \rightarrow \infty, O(n \log(n)) \right)$$

Index

- σ -Algebra, **3**
- absolut, **7**
 - stetig, **15**, **18**, **20**, **35**
 - stetige Zufallsvariable, **14**, **24**, **25**
 - stetiger Zufallsvektor, **18**, **19**, **21**, **22**, **27**
- absolute Permutation, *siehe* Permutation
- Algebra, **2**
- Alias Algorithmus, **42**
- Bayes'sche Formel, **10**
- bedingte Wahrscheinlichkeit, **9**
- Berry Esséen, **39**
- Binomialverteilung, **12**, **13**, **17**, **18**, **25**, **28**, **34**
- Borelsche σ -Algebra, **11**
- Box-Muller-Methode, **22**, **43**
- Cauchyverteilung, **16**
- charakteristische Funktion, **34**, **35**–**37**
- Dichte, **11**, **14**, **18**–**22**, **24**, **25**, **27**, **31**, **35**
 - Cauchyverteilung, **16**
 - Exponentialverteilung, **15**
 - Gleichverteilung, **16**
 - Normalverteilung, **15**
 - 2-dimensionale, **30**
- Dichtetransformation, **22**
- diskrete
 - Verteilungsfunktion, *siehe* Zähldichte
 - Zufallsvariable, **11**, **21**, **24**, **25**, **42**
- diskreter Zufallsvektor, **18**, **19**, **21**, **27**
- Eindeutigkeitssatz, *siehe* Satz
- Elementarereignis, **2**
- Ereignis, **2**
- Erwartungswert, **24**, **26**–**28**, **39**, **40**
- Erwartungswertvektor, **30**
- erzeugende Funktion, **33**, **34**
- Exponentialverteilung, **15**
- Faltung, **36**
- Faltungsformel, **21**
- Gedächtnislosigkeit, **16**
- gemeinsame
 - Dichte, **21**, **22**
 - Verteilung, **17**
 - Verteilungsfunktion, **18**
 - Zähldichte, **18**
- Geometrische Verteilung, **14**
- Gesetz der großen Zahlen
 - Schwaches, **39**
 - Starkes, **40**
- Gleichverteilung, **16**
- Grenzwertsatz
 - von DeMoivre-Laplace, **38**
 - von Poisson, **34**
- Hypergeometrische Verteilung, **13**
- Inversionsmethode, **43**
- k-tes Moment, **25**
- k-tes zentriertes Moment, **25**
- Kombination, **5**, **6**
- Kombinatorik, **2**
- Korrelationskoeffizient, **28**, **29**
- Kovarianz, **28**
- Kovarianzmatrix, **30**
- Laplacescher Wahrscheinlichkeitraum, **4**
- Messraum, **3**
- Mittelwert der Verteilung, **24**
- Monte Carlo Simulation, **40**
- Multinomialverteilung, **17**, **18**
- Multiplikationssatz, **9**
- Negative Binomialverteilung, **14**
- Normalverteilung, **15**, **24**, **35**, **36**, **43**
 - 2-dimensionale, **30**
- Permutation, **4**, **5**, **7**
 - absolute, **7**
- Poisson-Verteilung, **13**, **21**, **34**, **43**
- Pseudo-Zufallszahlen, *siehe* Zufallszahlen

q-Quantil, **39**
 Quantilfunktion, **43**
 Quicksort, **44**

Randdichte, **18, 20**
 Randomisierte Algorithmen, **44**
 Las Vegas, **44**
 Monte Carlo, **44**
 Randverteilung, **18, 30**

Satz
 Eindeutigkeitssatz, **36**
 für erzeugende Funktionen, **33**
 von der totalen Wahrscheinlichkeit, **9**
 Siebformel, **4**
 Standardabweichung, **25, 26**
 Standardnormalverteilung, **15, 35, 39, 43**
 Stetigkeitssatz, **36, 37**
 für erzeugende Funktionen, **34**

Taylor-Reihe, **37**

unabhängige
 Ereignisse, **8**
 Zufallsvariablen, **19, 36**

Ungleichung
 Markovsche, **31**
 von Cauchy-Schwarz, **31**
 von Chebyshev, **31, 39**

unkorreliert, **28, 29**

Varianz, **25, 26**
 Verteilungsfunktion, **11, 12–14, 17, 18, 33, 36, 42, 43**
 Exponentialverteilung, **16**
 Gleichverteilung, **16**
 Normalverteilung, **15**

Wahrscheinlichkeits-
 maß, **3, 4**
 raum, **2, 3, 4, 8, 9, 11, 16**

Zähl-dichte, **12, 21, 24, 25, 27, 33, 34**
 Binomialverteilung, **13**
 Negative, **14**
 Geometrische Verteilung, **14**
 Hypergeometrische Verteilung, **13**
 Multinomialverteilung, **17**
 Poisson-Verteilung, **13**

Zentraler Grenzwertsatz, **37, 38**
 Ziehen
 mit Zurücklegen
 mit Reihenfolge, **5**
 ohne Reihenfolge, **6**
 ohne Zurücklegen
 mit Reihenfolge, **5**
 ohne Reihenfolge, **5**
 Zufallsvariable, **11, 14, 16, 19–21, 24–29, 31, 33–43**
 Zufallsvektor, **16, 17, 18, 20, 30**
 Zufallszahlen, **42**
 $(0, 1)$ -gleichverteilte, **42**
 Pseudo-, **42**